

## Blessures du Fouet

Une petite plaie initiale n'arrive pas à cicatriser à cause des chocs répétés qui empêchent la cicatrisation. La démangeaison provoquée incite le chien à mordiller ou mordre la zone, ce qui augmente encore la lésion.

C'est le plus souvent un problème familial, avec des dogues à queue un peu longue et qui ont tendance à l'agiter beaucoup.

### *Traitement*

Il faut intervenir le plus tôt possible et ne retirer les pansements que lorsque la cicatrisation est parfaite, ce qui peut prendre des mois !

Différentes solutions peuvent être tentées en fonction du tempérament du chien et de l'étendue des lésions, car aucune n'est parfaite.

Il faut que la zone lésée ne soit plus frappée contre les murs ou des objets durs pour permettre la cicatrisation :

- Passer de la pommade cicatrisante, mettre une compresse, entourer d'un gros coussin de ouate qui amortira les chocs et mettre une bande collante qui remontera jusqu'à la moitié de la queue, voire plus. Le chien cherchera à l'ôter les premiers jours puis finira par s'y habituer
- Attacher la queue à la cuisse
- Passer la queue sous le ventre et l'attacher par un lien de chaque côté qui viennent se nouer au-dessus du dos.

Pour les dogues qui ne supportent aucun pansement ni d'avoir la queue attachée, on peut essayer de badigeonner à l'argile verte les plaies. En séchant, l'argile protège la plaie mais finit par s'émietter en poussière lors des chocs : il faut alors en remettre régulièrement.

Quand la cicatrisation est impossible, seule une amputation qui ne laissera qu'un tiers de la queue permettra de résoudre le problème.