

## ECTROPION

L'ectropion correspond à une éversion du bord palpébral, exposant de façon anormale la conjonctive palpébrale. Cette malposition palpébrale concerne habituellement la paupière inférieure, souvent associée à une taille excessive de la fente palpébrale.

### Causes

L'ectropion d'origine génétique est dû à un défaut de conformation de la paupière, souvent de longueur excessive.

### Age d'apparition des symptômes :

Le défaut de conformation de la paupière inférieure apparaît dès les premiers mois.

Pas de prédisposition sexuelle.

### Symptômes

L'éversion du bord libre de la paupière se manifeste par une exposition anormale de la conjonctive palpébrale et de la membrane nictitante, et l'exposition de la partie ventrale de la cornée et de la sclère.

Chez le dogue allemand, l'ectropion de la paupière inférieure est associé à une taille excessive de la fente palpébrale. L'ectropion est alors localisé à la portion médiale de la paupière et ce défaut de conformation entraîne un entropion des portions médiale et latérale de la paupière.

Une conjonctivite chronique et des sécrétions oculaires mucopurulentes sont souvent associés. Dans les cas les plus graves, une kératite d'exposition par manque de lubrification de la cornée est présente.

### Evolution :

L'évolution se fait vers une conjonctivite chronique, plus ou moins associée à une kératite.

### Pronostic :

Il dépend des complications associées : La conjonctivite chronique est à l'origine d'une douleur oculaire plus ou moins marquée ; en cas de kératite importante, la vision peut être altérée.

### Traitement :

Lors d'ectropion mineur, il est conseillé de ne pas corriger le défaut et de réaliser un traitement hygiénique régulier afin de limiter l'accumulation de particules irritantes dans le cul de sac conjonctival. Si l'ectropion est marqué, à l'origine d'une douleur et/ou d'une gêne visuelle, une correction chirurgicale est recommandée.