

MEGAOESOPHAGE

Le mégaoesophage est un défaut de contraction et une dilatation anormale de l'œsophage : les aliments stagnent dans l'œsophage au lieu d'être dirigés dans l'estomac.

Ne pas confondre avec la persistance du 4^{ème} arc aortique : Le 4^{ème} arc aortique droit disparaît normalement au cours du développement embryonnaire, sa persistance provoque une gêne mécanique qui donne les mêmes symptômes.

Symptômes

- Après le repas le chiot respire anormalement, prend un air angoissé, puis régurgite.
- Dans une portée ce chiot est maigre, mange très gloutonnement et présente vite un retard de croissance.

Diagnostic :

Par une radiographie du thorax.

Il peut être nécessaire de faire avaler un produit de contraste (baryte).

Une bronchopneumonie peut également être visualisée sur une radiographie thoracique.

Traitement :

Traitement au viagra :

(1 à 3 mg/kg) 2 à 3 fois par jour par voie buccale ou 1,9 mg/kg toutes les 8 heures par voie buccale)

Mesures hygiéniques :

Gamelles placées en hauteur, alimentation molle en boulette en petites quantités plusieurs fois par jour, repas suivi d'une mise en position verticale (voire assise) pendant 5 à 10 minutes.

L'objectif est de faciliter par gravité le passage des aliments et de l'eau dans l'estomac.

Pronostic :

Si le chien répond correctement au traitement viagra dans les 8 jours sans faire de bronchopneumonie, le pronostic est favorable.

Sinon, dans la majorité des cas, les bronchopneumonies à répétition et la perte de poids importante mettent en jeu la qualité de vie. Le pronostic est alors sombre.